


体力が
大幅に低下する
換羽中に



換羽用

乳酸菌混合飼料
FINELACT[®]
ファインラクト

製品特長

健康な鶏由来の高濃度ロイテリ菌が活躍します。

換羽用「ファインラクト」には、健康な鶏より選抜した
当社独自のロイテリ菌を含む、2種類の乳酸菌が高濃度で入っています。
またオリゴ糖は有用菌の増殖・定着をサポートします。



乳酸菌（ロイテリ菌）



産卵鶏にご使用いただけます。

換羽中にご使用いただけます。

製品概要

飼料の種類 乳酸菌混合飼料

原材料名 オリゴ糖、砂糖、乳酸菌

保存上の注意 使用当日まで冷凍で保存してください。

給与上の注意

- 他製品との混合は避けてください。
- 使用する水は、常温水（10℃～25℃）で水道水レベルの塩素濃度（2ppm程度）であれば問題ありません。
- 混合する容器は、事前に十分洗浄し、残留物の影響を受けないようにしてください。
- 換羽用「ファインラクト」の乳酸菌は空気に触れると死滅し始めますので、混合直前に開封してください。
- 溶解後は速やかに給与し、再凍結はしないでください。
- 1袋分すべて一度で使い切ってください。

給与方法 ※基本的には農場でワクチンを投与する方法に準じてください。

- ① 使用する30分程度前に冷凍庫より取り出して常温に戻してください。
屋外での添加時は、直射日光を避けて作業してください。
- ② 鶏1万羽当たり換羽用「ファインラクト」1袋（60g）を目安にご使用ください。
換羽用「ファインラクト」1袋（60g）を鶏が24時間連続給与に必要な量の水に溶解してください。混合する際は、
泡立て器等を用いて十分に攪拌しながら換羽用「ファインラクト」をさらさらと少量ずつ加えてください。
※飲水量の目安についてはホームページ <https://www.asahibiocycle.com> をご参照ください。
- ③ 速やかに流量比例式混入器にセットしてください。
換羽用「ファインラクト」は飲水に常時給与することが重要になりますが、
給与開始後24時間が経過した時点で新しく溶解したものと交換し、残ったものは破棄してください。
※給与推奨量以上与えても問題はありません。

アサヒバイオサイクル株式会社

アニマルニュートリション事業部

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 2-4-1

☎03-6412-3310 ☎03-5721-4005

メールアドレス info@asahibiocycle.co.jp


ホームページ <https://www.asahibiocycle.com>

お取扱店

※「ファインラクト」「FINELACT」はアサヒバイオサイクル株式会社の登録商標です。

2020.04.1000

CALPIS



乳酸菌のチカラで鶏の健康をサポートします！

乳酸菌混合飼料

FINELACT[®]

雛用

成鶏用

換羽用

タイミングにあわせた **3** つのファインラクト

初生ヒナの
有用菌優勢な
腸内菌叢
形成に




乳酸菌混合飼料
FINELACT^S
ファインラクト^S

雛用



A飼料

ワクチン投与、
暑熱、鶏舎の移動
などのストレスの
かかる時期に




乳酸菌混合飼料
FINELACT[®]
ファインラクト

成鶏用



A飼料

体力が
大幅に低下する
換羽中に




乳酸菌混合飼料
FINELACT[®]
ファインラクト

換羽用



A飼料

初生ヒナの
有用菌優勢な
腸内菌叢
形成に



雛用

乳酸菌混合飼料
FINELACT[®] S
ファインラクト S

製品特長

健康な雛由来の高濃度ロイテリ菌が活躍します。

雛用「ファインラクト」Sには、健康な雛より選抜した
独自の乳酸菌（ロイテリ菌）が高濃度で入っています。



乳酸菌（ロイテリ菌）



産卵鶏、ブロイラー、種鶏にご使用いただけます。

孵化時あるいは入雛時にご使用いただけます。

製品概要

飼料の種類 乳酸菌混合飼料

原材料名 デキストリン、乳酸菌

荷 姿 1袋（15g入）＝ 1万羽分
FC15：5万羽用
（15g×5袋・スタンドパウチ）


保存上の注意 使用当日まで冷凍で保存してください。

給与上の注意 ● 使用する水は、精製水または塩素を抜いた水を
常温（10℃～25℃）で使用ください。
● 混合する容器は、事前に十分洗浄し、残留物の影響を受けないようにしてください。
● 雛用「ファインラクト」Sの乳酸菌は空気に触れると死滅し始めますので、混合直前に開封してください。
● 溶解後は速やか（2時間以内）に給与し、再凍結はしないでください。
● 1袋分すべて一度で使い切ってください。

給与方法例 ① 使用する30分程度前に冷凍庫より取り出して常温に戻してください。
屋外での添加時は、直射日光を避けて作業してください。
② 雛1万羽当たり雛用「ファインラクト」S 1袋（15g）を目安にご使用ください。
雛用「ファインラクト」S 1袋（15g）を0.5ℓ以上の水に溶解してください。混合する際は、泡立て器等を
用いて十分に攪拌しながら雛用「ファインラクト」Sをさらさらと少量ずつ加えてください。
③ 速やかに飲水器に分注し、雛に給与してください。
※給与推奨量以上与えても問題はありません。

ロイテリ菌給与時の3日齢回腸絨毛

(Casas IA, et al, 1998)



無処理

ロイテリ菌給与

絨毛発達に
貢献!

A飼料

ワクチン投与、
暑熱、鶏舎の移動
などのストレスの
かかる時期に




成鶏用

乳酸菌混合飼料
FINELACT[®]
ファインラクト

製品特長

健康な鶏由来の高濃度ロイテリ菌が活躍します。

成鶏用「ファインラクト」には、健康な鶏より選抜した
独自のロイテリ菌を含む、2種類の乳酸菌が高濃度で入っています。



乳酸菌（ロイテリ菌）



産卵鶏、ブロイラー、種鶏にご使用いただけます。

鶏舎移動、エサの切り替えなどの時期に!

製品概要

飼料の種類 乳酸菌混合飼料

原材料名 デキストリン、乳酸菌

荷 姿 1袋（50g入）＝ 1万羽分
FLDS：5万羽用（50g×5袋・スタンドパウチ）
FLD：20万羽用（50g×5袋×4個）
1袋（13g入）＝ 2,500羽用
FLDQS：5万羽用（13g×20袋・スタンドパウチ）
FLDQ：20万羽用（13g×20袋×4個）

保存上の注意 使用当日まで冷凍で保存してください。

給与上の注意 ● 他製品との混合は避けてください。
● 使用する水は、常温水（10℃～25℃）で水道水レベルの塩素濃度（2ppm程度）であれば問題ありません。
● 混合する容器は、事前に十分洗浄し、残留物の影響を受けないようにしてください。
● 成鶏用「ファインラクト」の乳酸菌は空気に触れると死滅し始めますので、混合直前に開封してください。
● 溶解後は速やかに給与し、再凍結はしないでください。
● 1袋分すべて一度で使い切ってください。

給与方法例 ※基本的には農場でワクチンを投与方法に準じてください。
① 使用する30分程度前に冷凍庫より取り出して常温に戻してください。
屋外での添加時は、直射日光を避けて作業してください。
② 鶏1万羽当たり成鶏用「ファインラクト」1袋（50g）、鶏2,500羽当たり成鶏用「ファインラクト」1袋（13g）
を目安にご使用ください。
鶏が2時間程度で飲みきる量の水に溶解してください。
混合する際は、泡立て器等を用いて十分に攪拌しながら成鶏用「ファインラクト」をさらさらと少量ずつ
加えてください。
※飲水量の目安についてはホームページ <https://www.asahibiocycle.com> をご参照ください。
③ 速やかに流量比例式混入器にセットしてください。
※給与推奨量以上与えても問題はありません。